



## Heilsumálaráðið

Dagfesting: 15-10-2020  
Mál nr.: 20/00771-4  
Málsviðgjört: GMM

### Uppskot til

#### Kunngerð um

### ávísing til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum 15-35 ár, sum hava angist ella lætt til moderat tunglyndi

Við heimild í § 2, stk. 2. í lögtingslóg nr. .... frá .... um royndarskipan um ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð til persónar millum 15 og 35 ár, sum hava angist ella lætt til moderat tunglyndi verður ásett:

**§ 1.** Ein treyt fyri at fáa ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð er, at viðgerðin verður veitt av sálarfrøðingi, sum virkar sambært sáttmála við Heilsutrygd.

*Stk. 2.* Á heimasíðuni hjá Heilsutrygd sæst yvirlit yvir sálarfrøðingar, sum virka sambært sáttmála við Heilsutrygd.

**§ 2.** Áðrenn viðgerðin kann byrja, skal tað fyriligggja ein skrivlig ella teldutøk ávísing frá kommunulækna.

*Stk. 2.* Um kommunulæknin metir, at ein persónur hevur bráðfeingis tørv á

sálarfrøðiligari viðgerð, kann ávísingin gerast á annan hátt. Skjótast gjørligt eftir hetta skal tað gerast ein skrivlig ella teldutøk ávísing. Ávísingin er bert galdandi, um sálarfrøðingurin fær ávísingina í seinasta lagi 1 mánað eftir, at hon er gjørd.

*Stk. 3.* Kommunulækni kann bert ávísa til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð, um persónurin lýkur treytirnar nevndar í skjali 1.

*Stk. 4.* Sálarfrøðingur kann bert viðgera persónar, sum lúka treytirnar nevndar í skjali 1.

**§ 2.** Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Heilsumálaráðið, 15-10-2020

**Kaj Leo Holm Johannesen**  
landstýrismaður

/ Turid Arge

## Treytir fyri at fáa ávísing frá kommunulækna til ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð

### *Avmarking av persónsbólki við løttum til moderatum tunglyndi*

Treytir fyri at persónar við løttum til moderatum tunglyndi, eru fevndir av skipanini:

- 1) Persónurin skal vera læknafakliga diagnostisk útgreinaður sambært galdandi kliniskum leiðreglum innan øki; harumframt skal tað gerast ein psykometrisk screening so sum "Major ICD-10 Depression Spørgeskema".
- 2) Virkisførleikin hjá persóninum skal vera lætt ella moderat niðursettur orsaka av tunglyndinum hjá persóninum.
- 3) Sambært eini læknafakligari meting vil persónurin fáa gagn av sálarfrøðiligari viðgerð hjá løggildum sálarfrøðingi, og mett verður harumframt, at tað ikki er nóg mikið við viðtalum hjá kommunulækna sum einasta viðgerð.

### *Avmarking av persónsbólki við angist*

Treytir fyri at persónar við angist, eru fevndir av skipanini:

- 1) Persónurin skal vera læknafakliga diagnostisk útgreinaður sambært galdandi kliniskum leiðreglum innan øki; harumframt kann tað gerast ein psykometrisk screening so sum "Angst-Symptom-Spørgeskemaet (ASS)".
- 2) Kommunulæknin hjá persóninum skal hava diagnostiserað viðkomandi við einari av niðanfyrinevndu diagnosum (sambært ICD-10 klassifikatiónum)

- F40.0 Agorafobi
- F40.1 Sosialfobi
- F40.2 Einkult fobi
- F41.0 Panikkangist
- F41.1 Generaliserað angist
- F41.2 Lætt angist-tunglyndi
- F41.3 Onnur blandað angiststøða
- F41.8 Aðrar angiststøður
- F41.9 Angiststøða, sum ikki er greinað eftir slagi
- F42.0 Obsessiv-kompulsiv atferð
- F43.1 Posttraumatisk belastningsreaktióin

- 3) Virkisførleikin hjá persóninum skal vera lætt ella moderat niðursettur orsaka av angiststøðuni hjá persóninum.

4) Sambært eini læknafakligari meting vil persónurin fáa gagn av sálarfrøðiligari viðgerð hjá lóggildum sálarfrøðingi, og mett verður harumframt, at tað ikki er nóg mikið við viðtalum hjá kommunulækna sum einasta viðgerð.